

Blodkomponenter

Blodkomponent	Innehåll	Förvaring	Anmärkning
Erytrocyter, SAGMAN, leukocytreducerade	Volym 250 - 320 mL Plasmainnehåll 10 - 20 mL Leukocyter <1x10 ⁶ /enhet SAGMAN - lösning 100 mL EVF 0,50- 0,70	Förvaras i blodkyl + 4°C	Transfusionen ska vara avslutad inom 4 tim En enhet höjer B-Hb med ca 10 g/L
Trombocyter, leukocyt-och patogenreducerade*	Trombocyter, suspenderade i blandning av plasma och buffertlösning (PAS-E). Patogenreducerade efter fram ställning. Trombocyter 200-350 x10 ⁹ /enhet Leukocyter <1x10 ⁶ /enhet	Förvaras i + 22°C	Transfusionen ska vara avslutad inom 30 min efter avhämtning
Trombocyter, leukocytreducerade	Trombocyter, suspenderade i blandning av plasma och buffertlösning Trombocyter 200-350 x10 ⁹ /enhet Leukocyter <1x10 ⁶ /enhet	Förvaras i + 22°C	Transfusionen ska vara avslutad inom 30 min efter avhämtning
Plasma fryst, tinad, leukocytreducerade	Volym 240 - 320 mL Leukocyter <1x10 ⁶ /enhet	Tinad plasma förvaras i blodkyl + 4°C	Transfusionen ska vara avslutad inom 4 tim
Erytrocyter för utbytestransfusion, bestrålade och leukocytreducerade, uppslammade i plasma	Volym 240 - 320 mL Plasmainnehåll ca 170 mL Leukocyter <1x10 ⁶ /enhet EVF 0,50-0,55	Förvaras i blodkyl + 4°C	Transfusionen skall vara avslutad inom 4 tim Ska beställas Finns ej i lager

*Patogenreducering är likvärdig med bestrålning vad gäller inaktivering av lymfocyter som profylax mot transfusionsassocierad graft-versus-host sjukdom