

Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar

Analys	Remiss	Provtagning	Anmärkning
Blodgruppering	Blodcentralen, vit med blå kant	1 st EDTA-rör Barn < 6 mån: 1 st mikrorör EDTA	Innebär bestämning av ABO, Rh D samt kontroll av ev. irreguljära erythrocytantikroppar Vid akut blodgruppering utförs inte kontroll av irreguljära erythrocytantikroppar
Blodgruppering, mödrar (fetalt RhD)	Blodcentralen, vit med blå kant	2 st EDTA-rör	Innebär bestämning av ABO, Rh D samt kontroll av ev. irreguljära erythrocytantikroppar
Immuniserings- undersökning	Blodcentralen, vit med blå kant	1 st EDTA-rör	Avser bl.a. immuniserings- undersökning vid graviditet
Utredning av erythrocyt- antikroppar	Blodcentralen, vit med blå kant	2 st EDTA-rör	
Direkt antiglobulintest, DAT	Blodcentralen, vit med blå kant	1 st EDTA-rör Barn < 6 mån: 1 st mikrorör EDTA	Vid positiv DAT hos vuxna utförs komplettering med utvidgad DAT (IgG, C3d)
Förenlighetsprövning, BAS-test/ MG-test	Blodcentralen, vit med blå kant	1 st EDTA-rör	Blodgruppskontroll och antikroppsscreening inför en blodtransfusion För att undvika risk för förväxling ska prov för Blodgruppering och BAS-test/ MG-test tas vid olika tillfällen
Transfusionskomplikation	Blankett för webbaserad rapport finns på www.anvisningar.se	3 st EDTA-rör	Återlämna om möjligt aktuell blodkomponent med tillhörande transfusionsdokument till Blodcentralen