


Rem avd	 <b>Unilabs</b> Reserverad plats för laboratoriets provnummer	Patientdata (personnr, namn)
Betalningsansvarig		<b>Provtagningsdatum</b> <b>Provtagare</b>
Kopia till	<b>SNABBSVAR</b> <b>SVF</b>	Antal glas /burkar
<b>Provtyp</b> Vätskebaserad      Utstryk      HPV-typning      Övrig typning önskas		

**INDIKATION**

- 19
- 
- Screening
- 
- 21
- 
- Symptom
- 
- 22
- 
- Kontroll/utredning av atypi
- 
- 23
- 
- Uppföljning av obedömbart prov

**FÖR INFORMATION - SE BAKSIDAN!**

- 24
- 
- Peroperativ cervixdiagnostik
- 
- 25
- 
- Uppföljning av dysplasi ≤2 år efter behandling
- 
- 26
- 
- Uppföljning av dysplasi >2 år efter behandling
- 
- 27
- 
- Uppföljning av behandlad invasiv cancer

**TOPOGRAFI**

- 09
- 
- Standardprov (vätskebaserad 2 port, glas 3 port)
- 
- 11
- 
- Fraktionerat prov (2 burkar/glas)
- 
- 12
- 
- Vagina
- 
- 13
- 
- Portio
- 
- 14
- 
- Endocervix
- 
- 10
- 
- Annat – anges nedan i kommentar

**ANAMNES**

- 01
- 
- SM datum (år/mån/dag): .....
- 
- 02
- 
- Gravid vecka .....
- 
- 03
- 
- Partus datum (år/mån/dag) .....
- 
- 07
- 
- Menopaus
- 
- 08
- 
- Hormonbehandling (östrogen/gestagen)
- 
- 15
- 
- Blödningsrubbnig
- 
- 16
- 
- Strålbehandling av cervix år .....
- 
- 17
- 
- Pågående cytostatikabehandling
- 
- 18
- 
- Total uterusxstirpation

**KLINISKT STATUS**

- 30
- 
- Åtrofi
- 
- 31
- 
- U.a.
- 
- 32
- 
- Cervicit
- 
- 33
- 
- Prolaps
- 
- 34
- 
- Cervixpolyp
- 
- 35
- 
- Hormonspiral
- 
- 36
- 
- Kopparspiral
- 
- 37
- 
- Blödning
- 
- 38
- 
- Avvikande flytning
- 
- 39
- 
- Annat .....
- 
- 40
- 
- Cervixstenos

**KOLPOSKOPI**

- 41
- 
- Ej utförd
- 
- 42
- 
- Normal
- 
- 43
- 
- Låggradig atypisk
- 
- 44
- 
- Höggradig atypisk
- 
- 45
- 
- Svårbedömd
- 
- 46
- 
- Typ av TZ (1-3)
- 
- 47
- 
- Swedscorepoäng (1-10 p)
- 
- 48
- 
- PX taget vid undersökning

Kommentar:

**UTLÅTANDE**

- 
- Benigt cellfynd
- 
- Obesvarat p.g.a:
- 
- 
- Endocervikala celler saknas

Datum: ..... Cytodiagnostiker: ..... Läkare: .....

<p>Under rubrikerna Indikation och Topografi ska alltid ett och endast <b>ett</b> alternativ markeras med kryss.  Under rubrikerna Anamnes, Kliniskt status och Kolposkopi skall <b>ett eller flera</b> alternativ markeras.  <b>ORDFÖRKLARINGAR:</b></p>	
<b>Screening</b>	Provet tas från symtomfri patient som ej ingår i särskilt uppföljningsprogram.
<b>Symtom</b>	Prov tas från patient pga. symtom (som specificeras) under Anamnes och Kliniskt status rubrik på remissblanketten), främst som del i undersökning för att utesluta invasiv, symtomgivande cervixcancer.
<b>Kontroll/utredning av atypi</b>	Prov tas som led i utredning av tidigare påvidas atypi, som (ännu) ej har föranlett behandling.
<b>Uppföljning av obediömbart prov</b>	Nytt prov tas därför att föregående prov ej hade tillfredsställande bedömbarmhet vid laboratoriet.
<b>Peroperativ cervixdiagnostik</b>	Prov tas för diagnostik av ev kvarvarande förändringar i endocervix efter dysplasibehandling. Ersätter därmed cervixabrasio.
<b>Fraktionerat prov</b>	Portioprov ska märkas som nr 1. Endocervikala provet som nr 2.
<b>SM</b>	Senaste menstruationens första dag.
<b>Gravid vecka</b>	Patienten är gravid. Antalet veckor kan valfritt vara ingångna veckor eller fullbordade veckor.
<b>Partus</b>	Ifylls om patienten har fött barn senaste året.
<b>Menopaus</b>	12 månaders frånvaro av menstruation hos kvinna i klimakterieåldern.
<b>Hormonbehandling</b>	Innefattar p-piller, minipiller, p-spruta, p-stav och all klimakteriebehandling i form av medelpotent eller lågpotent östrogen, inklusive receptfritt östrogen såsom Ovesterin. Innefattar ej hälsokostpreparat och östrogenreceptor-modulerare såsom Nolvadex och Evista.
<b>Blödningsrubbnig</b>	Vaginal blödnig som avviker från mönster som är normalt för ålder och tillstånd (ex. graviditet).
<b>Strålbehandling av cervix</b>	Cervix har tidigare varit utsatt för lokal eller extern medicinsk strålbehandling.
<b>Total uterusextirpation</b>	Hela livmodern inklusive livmoderhalsen är bortopererad.
<b>Cervicit</b>	Avvikande, ofta varig flytning, lättblödande portio. Det föreligger också avvikande wet-smear med kraftig leukocytos.
<b>Cervixpolyp</b>	Endocervikal polyp som är synlig vid undersökning.
<b>Blödnig</b>	Pågående eller påtagligt lättprovocerad blödnig från livmoderhalsen.
<b>Avvikande flytning</b>	Flytning som med lukt, konsistens, färg och/eller mängd avviker från det för ålder och tillstånd (graviditet, ovulation etc.) normala.
<b>Atrofi</b>	Klinisk bedömning att slemhinnan är påtagligt atrofisk.
<b>Cervixstenos</b>	Förträngning av cervixkanalen som omöjliggör cellprovtagning.
<b>Typ av TZ</b>	Transformationszon typ 1, 2 eller 3. Se vårdprogrammet.
<b>Swedscore</b>	Scoringsystem för kolposkopi. 0 - 10 p. Se vårdprogrammet.

Fullständiga provtagningsanvisningar och fler definitioner av begrepp: [se www.oc.gu.se/ROCK](http://www.oc.gu.se/ROCK) resp [oc.gu.se/pdf/vpcervix.pdf](http://oc.gu.se/pdf/vpcervix.pdf)