


Rem avd	 Unilabs Reserverad plats för laboratoriets provnummer	Patientdata (personnr, namn)
Betalningsansvarig		Provtagningsdatum Provtagare
Kopia till	SNABBSVAR SVF	Antal glas /burkar
Provtyp HPV-analys HPV-analys och cytologisk analys (dubbelanalys) HPV-analys med cytologisk analys om positiv för HPV (reflexcytologi)		

INDIKATION

- 19 Screening
21 Symptom
22 Kontroll/utredning av atypi
23 Uppföljning av obediömbart prov

FÖR INFORMATION - SE BAKSIDAN!

- 24 Peroperativ cervixdiagnostik
25 Uppföljning av dysplasi ≤2 år efter behandling
26 Uppföljning av dysplasi >2 år efter behandling
27 Uppföljning av behandlad invasiv cancer

TOPOGRAFI

- 09 Standardprov (vätskebaserad 2 port, glas 3 port) 13 Portio
11 Fraktionerat prov (2 burkar/glas) 14 Endocervix
12 Vagina 10 Annat – anges nedan i kommentar

ANAMNES

- 01 SM datum (år/mån/dag):
02 Gravid vecka
03 Partus datum (år/mån/dag)
07 Menopaus
08 Hormonbehandling (östrogen/gestagen)
- 15 Blödningsrubbnig
16 Strålbehandling av cervix år
17 Pågående cytostatikabehandling
18 Total uterusxstirpation

KLINISKT STATUS

- 30 Åtrofi 36 Kopparspiral
31 U.a.
32 Cervicit 37 Blödning
33 Prolaps 38 Avvikande flytning
34 Cervixpolyp 39 Annat
35 Hormonspiral 40 Cervixstenos

KOLPOKOPI

- 41 Ej utförd 45 Svårbedömd
42 Normal 46 Typ av TZ (1-3)
43 Låggradig atypisk 47 Swedscorepoäng (1-10 p)
44 Höggradig atypisk 48 PX taget vid undersökning

Kommentar:

UTLÅTANDE

- Benigt cellfynd Obesvarat p.g.a:
 Endocervikala celler saknas

Datum: Cytodiagnostiker: Läkare:

<p>Under rubrikerna Indikation och Topografi ska alltid ett och endast ett alternativ markeras med kryss. Under rubrikerna Anamnes, Kliniskt status och Kolposkopi skall ett eller flera alternativ markeras. ORDFÖRKLARINGAR:</p>	
Screening	Provet tas från symtomfri patient som ej ingår i särskilt uppföljningsprogram.
Symtom	Prov tas från patient pga. symtom (som specificeras) under Anamnes och Kliniskt status rubrik på remissblanketten), främst som del i undersökning för att utesluta invasiv, symtomgivande cervixcancer.
Kontroll/utredning av atypi	Prov tas som led i utredning av tidigare påvidas atypi, som (ännu) ej har föranlett behandling.
Uppföljning av obediömbart prov	Nytt prov tas därför att föregående prov ej hade tillfredsställande bedömbarmhet vid laboratoriet.
Peroperativ cervixdiagnostik	Prov tas för diagnostik av ev kvarvarande förändringar i endocervix efter dysplasibehandling. Ersätter därmed cervixabrasio.
Fraktionerat prov	Portioprov ska märkas som nr 1. Endocervikala provet som nr 2.
SM	Senaste menstruationens första dag.
Gravid vecka	Patienten är gravid. Antalet veckor kan valfritt vara ingångna veckor eller fullbordade veckor.
Partus	Ifylls om patienten har fött barn senaste året.
Menopaus	12 månaders frånvaro av menstruation hos kvinna i klimakterieåldern.
Hormonbehandling	Innefattar p-piller, minipiller, p-spruta, p-stav och all klimakteriebehandling i form av medelpotent eller lågpotent östrogen, inklusive receptfritt östrogen såsom Ovesterin. Innefattar ej hälsokostpreparat och östrogenreceptor-modulerare såsom Nolvadex och Evista.
Blödningsrubbnig	Vaginal blödnig som avviker från mönster som är normalt för ålder och tillstånd (ex. graviditet).
Strålbehandling av cervix	Cervix har tidigare varit utsatt för lokal eller extern medicinsk strålbehandling.
Total uterusextirpation	Hela livmodern inklusive livmoderhalsen är bortopererad.
Cervicit	Avvikande, ofta varig flytning, lättblödande portio. Det föreligger också avvikande wet-smear med kraftig leukocytos.
Cervixpolyp	Endocervikal polyp som är synlig vid undersökning.
Blödnig	Pågående eller påtagligt lättprovocerad blödnig från livmoderhalsen.
Avvikande flytning	Flytning som med lukt, konsistens, färg och/eller mängd avviker från det för ålder och tillstånd (graviditet, ovulation etc.) normala.
Atrofi	Klinisk bedömning att slemhinnan är påtagligt atrofisk.
Cervixstenos	Förträngning av cervixkanalen som omöjliggör cellprovtagning.
Typ av TZ	Transformationszon typ 1, 2 eller 3. Se vårdprogrammet.
Swedscore	Scoringsystem för kolposkopi. 0 - 10 p. Se vårdprogrammet.

Fullständiga provtagningsanvisningar och fler definitioner av begrepp: [se www.oc.gu.se/ROCK](http://www.oc.gu.se/ROCK) resp oc.gu.se/pdf/vpcervix.pdf